


Uwaga ! Z niniejszą kartą należy się dokładnie zapoznać oraz zachować do wglądu podczas przyjęcia do szpitala.



Pieczętka Pracowni



Kraków, dnia.....

KONSULTACJA DO ZABIEGU ENDOSKOPOWEGO

Pacjent (ka).

Z rozpoznaniem

wymaga badania endoskopowego,

Planowany termin przyjęcia do Pracowni Endoskopii

warunkiem podjęcia takiego postępowania jest posiadanie następujących dokumentów :

1. Skierowanie do Pracowni Endoskopii od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Rodzinnego) z dopiskiem „kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym” oraz recepta na preparat przeczyszczający dostępny na rynku (np. Fortrans, Citra Fleet, Clensia, Eziclen).
2. EKG i konsultacja internistyczna lekarza POZ bądź kardiologa (z adnotacją: O OCENIE STANU ZDROWIA)
3. Wynik badania HbS lub zaświadczenie o wykonaniu 2 szczepień przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B (tzw. „żółtaczką zakaźną”). W przypadku pacjentów szczepionych kilka lat temu należy oznaczyć poziom przeciwciał przeciwko WZW typu B oraz rozważyć dawkę przypominającą szczepionki.
4. Badania dodatkowe (ważne do 7 dni przed badaniem: morfologia, cukier w surowicy krwi, APTT, INR, sód, potas, mocznik, kreatynina).
5. Pacjent zgłasza się na badanie z osobą towarzyszącą. Po badaniu, nie może prowadzić samochodu.

Uwaga ! Z niniejszą kartą należy się dokładnie zapoznać oraz zachować do wglądu podczas przyjęcia do szpitala.

1. **Na 5 dni** przed operacją **KONIECZNE JEST** odstawienie leków przeciwplatek, antykoagulantów (leki rozrzedzające krew), np. Acard, Polocard, Acesan, Alka-Prim, Asaltec, Aspifox, Aspirin, Bestpirin, Encopirin, Proficar, Ticlo, Iclopid, Ifapidin, Aclotin, Apo-Clodin, Acenokumarol, Warfin, Warfaryna, Sintrom itp., z ewentualnym przestawieniem na iniekcje heparyny drobnocząsteczkowej co należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym lub kardiologiem.
2. **Na 48 godzin** przed badaniem **KONIECZNE JEST** odstawienie leków stosowanych w cukrzycy -Metformina, Metformax, Metifor, Metral, Siofor, Glucophage, Formetic, Etform, Avamina i ewentualne przestawienie na preparaty insuliny. Pochodnych sulfonilomocznika tj Amaryl, Avaron, Diaril, Glibetic Glidiamid, GlimHexal, Glimepiride, Glipid, Glitoprel, Lamar, Pemidal, Symglic, nie należy przyjmować **24 godziny** przed planowanym zabiegiem.
3. Należy mieć ze sobą **PEŁNA DOKUMENTACJE** medyczną, w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, badań histopatologicznych.
4. Numery telefonów do kontaktu **Pracownia Endoskopii +4812 2578521**.
5. W dniu zaplanowanego badania pacjent zgłasza się na czczo do Pracowni Endoskopii w godzinach **8.30 – 9.00. bez rejestracji** .
6. W razie braku możliwości zgłoszenia się do przyjęcia, rezygnacji z leczenia itp. prosimy o wcześniejszą informację telefonicznie bądź osobiście.
7. **Termin badania może ulec zmianie** z przyczyn niezależnych od Pracowni Endoskopii.