

Pieczętka Pracowni

Kraków, dnia

KONSULTACJA DO ZABIEGU ENDOSKOPOWEGO

Pacjent (ka).

Z rozpoznaniem
wymaga badania endoskopowego,

Planowany termin przyjęcia do Pracowni Endoskopii

warunkiem podjęcia takiego postępowania jest posiadanie następujących dokumentów :

1. Skierowanie do Pracowni Endoskopii od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej /Rodzinnego/ z dopiskiem „kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym” oraz recepta na preparat przeczyszczający dostępny na rynku (np Fortrans, Citra Fleet, Clensia, Eziclen)
2. EKG i konsultacja internistyczna lekarza POZ bądź kardiologa (z adnotacją: O OCENIE STANU ZDROWIA
3. Wynik badania HbS lub zaświadczenie o wykonaniu 2 szczepień przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B /tzw. „żółtaczka zakaźna”/ W przypadku pacjentów szczepionych w kilka lat temu należy oznaczyć poziom przeciwciał przeciwko WZW typu B oraz rozważyć dawkę przypominającą szczepion
4. Badania dodatkowe (ważne do 7 dni przed badaniem: morfologia, cukier w surowicy krwi, APTT, INR, sód, potas, mocznik, kreatynina., grupa krwi potwierdzona, TSH jeśli pacjent miał problemy z tarczycą.
5. Pacjent zgłasza się na badanie z osobą towarzyszącą. Po badaniu, nie może prowadzić samochodu.

..

Uwaga ! Z niniejszą kartą należy się dokładnie zapoznać oraz zachować do wglądu podczas przyjęcia do szpitala.

1. **Na 5 dni** przed operacją **KONIECZNE JEST** odstawienie leków przeciwplatek, antykoagulantów /leki rozrzedzające krew/ np. Acard, Polocard, Acesan, Alka-Prim, Asaltec, Aspifox, Aspirin, Bestpirin, Encopirin, Proficar, Ticlo, Iclopid, Ifapidin, Aclotin, Apo-Clodin, Acenokumarol, Warfin, Warfaryna, Sintrom itp., z ewentualnym przestawieniem na iniekcje heparyny drobnocząsteczkowej co należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym lub kardiologiem.
2. **Na 48 godzin** przed badaniem **KONIECZNE JEST** odstawienie leków stosowanych w cukrzycy / Metformina , Metformax, Metifor, Metral, Siofor, Glucophage, Formetic, Etform, Avamina i ewentualne przestawienie na preparaty insuliny. Pochodnych sulfonilomocznika tj Amaryl, Avaron, Diaril, Glibetic Glidamid, GlimHexal, Glimepiride, Glipid, Glitoprel, Lamar, Pemidal, Symglic, nie należy przyjmować 24 godziny przed planowanym zabiegiem.
4. Należy mieć ze sobą **PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ** medyczną / w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, badań histopatologicznych,
8. Numery telefonów do kontaktu **Pracownia Endoskopii +4812 2578521.**
9. W dniu zaplanowanego badania pacjent zgłasza się na czczo do Pracowni Endoskopii w godzinach **8..30 – 9.00. bez rejestracji** .
12. W razie braku możliwości zgłoszenia się do przyjęcia, rezygnacji z leczenia itp. prosimy o wcześniejszą informację telefonicznie bądź osobiście.
13. **Termin badania może ulec zmianie** z przyczyn niezależnych od Pracowni Endoskopii.